

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Якимец Анны Владимировны
«Астенические расстройства в ремиссии приступообразно-прогредиентной
шизофрении (клинико-психопатологические, патогенетические, терапевтические
аспекты)», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.06. – «Психиатрия» (медицинские
науки)**

Актуальность изучения астенических расстройств при шизофрении обусловлена нерешенностью многих вопросов, касающихся клинико-психопатологических и патогенетических особенностей данных состояний. Одним из значимых направлений дальнейших исследований в данной области является разработка адекватных подходов к терапии астенической симптоматики в ремиссии шизофренического процесса. Следует отметить тот факт, что в имеющихся работах, посвященных проблеме шизоастении часто отсутствуют подробные описания этого многогранного феномена. Кроме того, до настоящего времени не разработана типология астенических расстройств, наблюдающихся в ремиссиях шизофрении, которая учитывала бы взаимосвязь данных нарушений с аффективной и негативной симптоматикой. В тоже время, анализ многочисленных публикаций указывает на практическое отсутствие таких клинико-биологических исследований, которые позволили бы объективизировать и расширить представление о тяжести и структуре астенической симптоматики при шизофрении. Все перечисленное позволяет оценить проведенную работу как своевременную и значимую для психиатрии.

В соответствии с целью диссертации автором сформулированы задачи, направленные на изучение различных аспектов клинических и биологических особенностей астенического симптомокомплекса в ремиссии приступообразно-прогредиентной шизофрении, а также оптимизацию фармакотерапии изучаемого контингента больных. Достаточный объем выборки и применение комплексного подхода с использованием клинико-психопатологического, психометрического, и нейроиммунологического методов, а также применение современной статистической обработки результатов, определили высокую степень достоверности полученных выводов.

Сочетание психопатологического и нейроиммунологического методов исследования является обоснованным методологическим подходом, позволяющим сформировать всестороннее представление о природе и сущности феномена астении в рамках ремиссии эндогенного процесса. По результатам проведенной работы была убедительно доказана вовлеченность воспалительных реакций в патогенез астенических расстройств, а также выявлено снижение протеазно-ингибиторного соотношения по сравнению с контролем у исследованного контингента больных. Автору удалось установить, что выделенные в исследовании клинические типы эндогенной астении («аффективно-астенический», «негативно-астенический») отличаются совершенно различными вариантами иммунной дисфункции.

Использованный в работе подход к диагностике типологических разновидностей эндогенной астении с использованием специально разработанного

